

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP30-7-68 0.0000

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative — 67 - STRASBOURG
Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F
Régisseur de recettes D.D.A.
2, Rue des Mineurs
67 - STRASBOURG

Supplément n° 3 au Bulletin du mois de Juillet 1968

29 Juillet 1968

Information

VIGNE

ARAIGNEES ROUGES

Nous avons déjà signalé l'apparition de foyers d'Araignées rouges dans des vignobles jusqu'ici épargnés, notamment dans le Bas-Rhin.

La période chaude actuelle est favorable à l'activité de ces déprédateurs et nous conseillons vivement aux viticulteurs des régions intéressées de ne pas omettre d'intervenir sur les générations estivales.

Une application acaricide réalisée au cours de la prochaine décade permettra de réduire les possibilités de ponte, et par là même, les populations au printemps prochain.

A noter qu'il existe des spécialités mixtes à la fois efficaces contre les Araignées rouges et les Vers de la grappe, de même que des préparations commerciales dont la composition permet une efficacité fongicide, acaricide et insecticide. Pour le choix du produit, se reporter à la liste technique en votre possession. Consulter également la publication de la Fédération des Groupements de Défense contre les Ennemis des Cultures, qui fait état des spécialités commerciales.

OIDIUM DE LA VIGNE

On note actuellement une progression rapide de l'Oïdium dans la plupart des vignobles. Les viticulteurs doivent porter beaucoup d'attention à la lutte contre cette maladie dont les effets sont souvent plus désastreux que ceux du Mildiou.

Un nouveau traitement devra être réalisé dès réception du présent avis. Certains produits mixtes permettent d'intervenir à la fois contre l'Oïdium et les Vers de la grappe.

VERS DE LA GRAPPE (2ème génération)

Dans le vignoble de la région de CLEEBOURG - ROTT - STEINSELTZ, etc... le traitement insecticide contre les Vers de la grappe devra être réalisé à partir du 30 Juillet.

.../...

POMMES DE TERRE

(Variétés sensibles au Mildiou)

MILDIOU

Après les fortes précipitations enregistrées au cours de la dernière décade, on note actuellement une rapide progression du Mildiou de la pomme de terre.

Dans les cultures de variétés sensibles dont l'arrachage n'est pas envisagé dans les jours prochains, il convient d'appliquer au plus tôt un traitement fongicide soigné.

Dans les parcelles plantées en variétés précoces qui n'ont pas pu être arrachées en raison du mauvais temps, opérer un défanage chimique dès que possible.

DEFANAGE

Le défanage chimique s'intègre dans un plan de lutte rationnelle contre le Mildiou et permet d'éviter les contaminations sur tubercules.

Il doit être réalisé avant une période pluvieuse.

Produits le plus souvent utilisés :

- Colorants nitrés en mélange avec le Gas-Oil.
- Diquat (dose du fabricant).
- Chlorate de soude en milieu humide (15 à 20 kg/ha suivant les terres).

HOUBLON

MILDIOU

La protection des hampes florales doit être assurée d'une façon correcte. Appliquer un nouveau traitement fongicide dans toutes les cultures houblonnières.

MAIS

(Arrondissement de WISSEMBOURG)

PYRALE DU MAIS

L'activité des papillons de Pyrale du maïs est relativement réduite dans cette région du Nord de l'Alsace et nous estimons que le traitement insecticide n'est pas nécessaire.

REPETITION DES TRAITEMENTS APRES UNE FORTE PLUIE

Tenir compte des indications données dans notre note du 20 Juin.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles :
J. BERNARD et C. GACHON.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux :
J. HARRANGER.